


IST	Prise de sang et analyses urinaires	Prise de sang	Examen clinique, prélèvement local
GONOCOQUE	Prélèvement local		
CHLAMYDIA LGV	Prélèvement local et analyses urinaires		
HÉPATITE A	Prise de sang		
HÉPATITE B	Prise de sang		
HÉPATITE C	Prise de sang – TROD**		
SYPHILIS	Prise de sang		
VIH/SIDA	Prise de sang – TROD**		
HPV (papillomavirus)			Examen clinique, prélèvement local

QUELS DÉPISTAGES, POUR QUELLES IST* ?

Rapport sexuel avec contact avec du sang = ●
Risque élevé = ●●●
Risque moyen = ●●
Risque faible = ●

IST*	CONTACT SEXUEL PAR PÉNÉTRATION	FELLATION	CUNNINGUS	ANUNINGUS	CAESSE SEXUELLE	BAISER	ECHANGE DE SÉRINGUE	SNIF	MÈRE – ENFANT
GONOCOQUE	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
CHLAMYDIA LGV	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
HPV (papillomavirus)	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
SYPHILIS	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
HÉRÈS GÉNITAL	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
HÉPATITE C	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
HÉPATITE B	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
HÉPATITE A	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
VIH/SIDA	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

TRANSMISSION DES IST* – NON TRAITÉES –



UN DÉPISTAGE DES IST* PERMET DE :

1

Connaître son statut vis-à-vis des IST* (souvent asymptomatiques)

2

Se soigner rapidement en cas d'infection et d'éviter des complications

3

Éviter de transmettre l'infection

BON À SAVOIR !

UN TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE) PEUT EMPÊCHER UNE CONTAMINATION AU VIH.

RDV aux Urgences d'un hôpital ou en CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) au mieux dans les 4h et au plus tard dans les 48h suivant la prise de risque.

LA PREP (PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION) EST UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION DU VIH.

Elle consiste à prendre un médicament antirétroviral (anti VIH) de manière continue ou discontinue. Elle s'adresse aux personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH.

Plaisirs et sexualités,
Je m'exprime sans tabou.
— INFO PRÉVENTION ET DÉPISTAGE IST*/VIH —



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

Le nouveau dispositif VIHTest te permet de te rendre dans n'importe quel labo sans ordonnance afin de faire un dépistage du VIH gratuitement !

> **GRATUIT**



SOIN DE VILLE

En demandant une ordonnance à un médecin de ville ou sage-femme afin de faire un **dépistage complet des IST** en laboratoire.

> **GRATUIT / REMBOURSÉ**

OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?



CEGIDD

Dans un CeGIDD (Centre Gratuit d'informations, de dépistage et de diagnostic), auprès des Services de Santé Universitaire, des CPEF... pour le VIH et les IST*

> **GRATUIT / ANONYME**



ASSOCIATIONS

Auprès d'associations habilitées pour faire un TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostic) Pour le VIH – VHC, tu peux aussi demander un autotest***.

> **GRATUIT / ANONYME**



PHARMACIE

En pharmacie, pour un autotest*** VIH.

> **PAYANT / ANONYME**